

SKÓRY SUROWE	NORMA BRANŻOWA	BN-68
	Skóry surowe zwierząt futerkowych	7713-01
	Skóry kun	Grupa katalogowa XV 85

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są skóry surowe z kun leśnych i domowych (kamionek).

1.2. Symbol skóry surowej z kuny leśnej i domowej: K.

2. PODZIAŁ I OZNACZENIE

2.1. Kategorie okrywy włosowej i mizdry. W zależności od jakości okrywy włosowej i mizdry różni się w każdym rodzaju 3 kategorie, oznaczone cyframi arabskimi: 1, 2, 3.

2.2. Kategorie wad. W zależności od nasilenia wad różni się w poszczególnych kategoriach okrywy włosowej i mizdry 4 kategorie wad, oznaczone literami: A, B, C, D.

2.3. Klasy skór. W zależności od kategorii okrywy włosowej i mizdry oraz kategorii wad skóry zalicza się do 5 klas, oznaczonych cyframi rzymskimi: I, II, III, IV, V.

2.4. Rodzaje skór. W zależności od umaszczenia różni się 2 rodzaje skór z kun:

- Kl - skóry z kun leśnych,
- Kd - skóry z kun domowych (kamionki).

2.5. Przykład oznaczenia skóry surowej z kuny leśnej drugiej kategorii okrywy włosowej i mizdry, kategorii wad A, klasy drugiej:

Kl 2A-II BN

3. WYMAGANIA

3.1. Zdjęcie skóry. Skóra powinna być zdjęta systemem workowym z pozostawieniem przy niej nosa, małżowin usznych bez chrząstek, rozciętej skóry z kończyn wraz z pazurkami oraz rozciętej skóry z ogona. Na skórze nie powinno być resztek mięśni, ścięgien, tłuszczu i skrzepów krwi. Kości kończyn

i kręgi ogona powinny być usunięte. Skóra powinna być wysuszona, odwrócona okrywą włosową na zewnątrz i mieć wymiary zgodne z ustalonymi wielkościami prawideł, na których skóry powinny być suszone.

3.2. Kategorie okrywy włosowej i mizdry oraz kategorie wad

Kategorie okrywy włosowej i mizdry	Cechy	Kategorie wad			
		A	B	C	D
1	okrywa włosowa zimowa w pełni dojrzała, mizdra czysta, bez sinych plam; dopuszcza się sine plamy tylko na ogonie i łapach; włosy pokrywowe części grzbietowej równomiernie rozmieszczone, z połyskiem, sprężyste, gęste, bez przerzedzeń na bokach i szyi, dobrze kryjące podszycie; podszycie części grzbietowej gęste; okrywa włosowa części brzusznej gęsta lub średnio gęsta	1A	1B	1C	1D
2	okrywa włosowa zimowa dojrzała, mizdra czysta, bez sinych plam; dopuszcza się plamy na ogonie i łapach oraz na części grzbietowej i brzusznej od nasady ogona do 15 cm w kierunku głowy; włosy pokrywowe części grzbietowej średnio długie, równomiernie rozmieszczone, z połyskiem, niezbyt sprężyste, średnio gęste, z lekkim przerzedzeniem na bokach i szyi; podszycie części grzbietowej średnio gęste; okrywa włosowa części brzusznej średnio gęsta	2A	2B	2C	2D

Centrala Surowców Włókienniczych i Skórzanych
 Ustanowiona przez Dyrektora CSWiS dnia 24 kwietnia 1968 r.
 jako norma obowiązująca w zakresie produkcji i obrotu od dnia 1 stycznia 1969 r.
 (Mon. Pol. nr 27/1968 poz.185).

cd. tablicy

Kategorie okrywy włosowej i mizdry	Cechy	Kategorie wad			
		A	B	C	D
3	okrywa włosowa niecałkowicie dojrziała lub przejrzała, mizdra z sinymi plamami do 25% powierzchni skóry; włosy pokrywowe części grzbietowej niedostatecznie wyrośnięte, nierównomiernie rozmieszczone, niesprężyste, rzadkie, słabo kryjące podszycie; okrywa włosowa w części brzusznej rzadka	3A	3B	3C	3D
<p>Kategoria A oznacza wady niepoliczalne i jedną małą policzalną.</p> <p>Kategoria B oznacza wady niepoliczalne oraz policzalne do 4 wad małych albo do 2 średnich lub 1 dużej.</p> <p>Kategoria C oznacza wady niepoliczalne oraz policzalne do 8 wad małych albo 4 wad średnich lub 2 wad dużych.</p> <p>Kategoria D oznacza wady niepoliczalne oraz policzalne w większej liczbie niż dla kategorii C lub inne wady nie wymienione w 3.3 (np. skóry silnie uszkodzone przez szkodniki) oraz mające okrywę włosową poniżej kategorii 3, nie dyskwalifikujące jeszcze skóry do celów futrzarskich.</p>					

Stwierdzenie choćby jednej cechy niższej od wymaganej dla danej kategorii okrywy włosowej i mizdry powoduje zaliczenie skóry do tej kategorii, w której ta cecha występuje.

3.3. Wady skór

Lp.	Grupa wad	Wyszczególnienie
1	Niepoliczalne	<p>a) rozdarcia i rozcięcia niezależnie od miejsca występowania mające do 1 cm długości, jeżeli występują w liczbie nie większej niż 2</p> <p>b) wszelkie uszkodzenia mizdry lub włosów o łącznej powierzchni 1 cm²</p> <p>c) wszelkie uszkodzenia lub brak pazurków, wąsów, skóry z dolnej szczęki, czubka nosa i uszu</p> <p>d) przewężenie (pozorne) skóry nad przednimi łapami u nasady szyi</p> <p>e) nieznaczne pofałdowanie skóry lub nieznaczny brak symetrii</p> <p>f) wszelkie inne wady i uszkodzenia znajdujące się na brzegu skóry szerokości 1 cm od krawędzi</p>
2	Policzalne małe	<p>a) rozdarcie i rozcięcie długości 2+5 cm</p> <p>b) dziury, łysiny, wytarcia i wychwyty włosów na grzbiecie o powierzchni 1+4 cm², na podbrzuszu i głowie o powierzchni 1+9 cm²</p> <p>c) brak części lub całości jednej łapy</p> <p>d) brak części ogona</p> <p>e) sfilcowanie lekkie na tylnym obrzeżu skóry szerokości 1+3 cm</p> <p>f) resztki mięśni, tłuszczu, krwi w niewielkiej ilości na warstwie podskórnej skóry (mizdra)</p> <p>g) zaplamienie okrywy włosowej (moczem, kałem, rdzą itp.) o powierzchni 1+4 cm²</p>
3	Policzalne średnie	<p>a) rozdarcie i rozcięcie długości 6-10 cm</p> <p>b) dziury, łysiny, wytarcia i wychwyty włosów na grzbiecie o powierzchni 5+9 cm², na podbrzuszu i głowie o powierzchni 10+19 cm²</p>

cd. tablicy

Lp.	Grupa wad	Wyszczególnienie
3	Policzalne średnie	<p>c) brak części lub całości 2 łap</p> <p>d) brak całego ogona lub pozostawienie kręgów w ogonie</p> <p>e) zaplamienie okrywy włosowej (moczem, kałem, rdzą, krwią itp.) o powierzchni 5+15 cm²</p> <p>f) sfilcowanie włosów (głębokie) o powierzchni 4+9 cm²</p> <p>g) resztki mięśni, tłuszczu, krwi w większej ilości w warstwie podskórnej skóry (mizdrze)</p> <p>h) poprzeczne lub podłużne wyraźne pofałdowanie skóry</p> <p>i) ogólna barwa okrywy włosowej jasno-beżowa, beżowożółta, beżowopiaskowa</p>
4	Policzalne duże	<p>a) rozdarcie lub rozcięcie o długości 11+20 cm</p> <p>b) dziury, łysiny, wytarcia i wychwyty włosów na grzbiecie o powierzchni 10+15 cm², na podbrzuszu i głowie o powierzchni 20+30 cm²</p> <p>c) brak części lub całości 4 łap</p> <p>d) zaplamienie okrywy włosowej (moczem, kałem, rdzą, krwią itp.) o powierzchni 16+30 cm²</p> <p>e) sfilcowanie włosów (głębokie) o powierzchni 10+20 cm²</p> <p>f) zapleśnienie, zrogowacenie skóry</p> <p>g) rozcięcie skóry wzdłuż podbrzusza</p>

3.4. Klasy skór

Klasy skór	Kategorie okrywy włosowej i mizdry oraz kategorie wad
I	1, 1A
II	1B, 2, 2A
III	1C, 2B, 3, 3A
IV	2C, 3B
V	3C; dopuszcza się 1D, 2D, 3D

3.5. Rodzaje skór i barwa okrywy włosowej

Rodzaje skór	Charakterystyka barwy okrywy włosowej
Skóry z kun leśnych	ogólna barwa okrywy włosowej od ciemno-kasztanowo-beżowej do kasztanowo-beżowej; włos pokrywowy kasztanowy do kasztanowordzawego, podszycie szarostalowe u podstawy i jasnoszare na końcach włosów puchowych; charakterystyczną cechą kun leśnych jest kremowopomarańczowa plama w różnych odcieniach na dolnej części szyi (na podgardlu); ogólna barwa na stronie brzusznej jaśniejsza od grzbietowej
Skóry z kun domowych (kamionki)	ogólna barwa okrywy włosowej od ciemno-kasztanowo-stalowej do kasztanowej ze stalowym odcieniem, włos pokrywowy koloru kasztanowego z okowianostalowym, podszycie koloru jasnostalowego do jasnoszarego; charakterystyczną cechą kun domowych (kamionek) jest biała plama w kształcie nieforemnej podkowy na dolnej części szyi (na podgardlu); ogólna barwa na stronie brzusznej jaśniejsza od grzbietowej

4. BADANIA

4.1. Rodzaje badań. Każdą skórę należy poddać następującym badaniom:

- sprawdzenie rodzaju,
- sprawdzenie prawidłowości zdjęcia i konserwacji skóry,
- sprawdzenie barwy,

- d) sprawdzenie okrywy włosowej i mizdry,
- e) wykrywanie wad.

4.2. Badania rozjemcze. W sprawach spornych oo do zakwalifikowania skóry do danej klasy służy odwołanie do upoważnionego rzeczoznawcy, uzgodnionego przez obydwie strony, który wyda orzeczenie.

4.3. Opis badań

4.3.1. Sprawdzenie rodzaju, prawidłowości zdjęcia i konserwacji skóry, barwy, okrywy włosowej i mizdry należy przeprowadzić przez oględziny, przy czym sprawdzenie barwy i okrywy włosowej należy przeprowadzić przy pełnym równomiernym oświetleniu naturalnym, jednak nie bezpośrednio w słońcu, lub w świetle sztucznym zbliżonym do światła dziennego.

4.3.2. Wykrywanie wad należy przeprowadzić przez oględziny, dotyk i ewentualny pomiar wad na skórze, z następującymi warunkami:

- a) za powierzchnię uszkodzoną należy przyjąć powierzchnię prostokąta opisanego na tym uszkodzeniu, czyli powierzchnię wynikającą z pomnożenia największej szerokości przez największą długość uszkodzenia, mierzonych z dokładnością do 0,5 cm,
- b) jeżeli dwie lub więcej uszkodzonych powierzchni oddziela nieuszkodzona przestrzeń mniejsza niż 1 cm, powierzchnie te należy traktować jako jedną,
- c) w przypadku występowania na powierzchni uszkodzonej dwóch lub więcej różnych uszkodzeń należy liczyć tylko jedno najpoważniejsze uszkodzenie; zasada ta nie dotyczy wad barwy,
- d) przez głębokie sfilcowanie należy rozumieć splątanie włosów, które tworzą zbitą masę wyczuwalną przy dotyku.

K O N I E C